

セフェム系抗生物質製剤

**日本薬局方 注射用セフォチアム塩酸塩
セフォチアム 塩酸塩静注用0.25g「SN」
セフォチアム 塩酸塩静注用0.5g「SN」
セフォチアム 塩酸塩静注用1g「SN」**

Cefotiam Hydrochloride

規制区分：処方箋医薬品

注意－医師等の処方箋に
より使用すること

貯 法：室温保存

使用期限：外装に表示

取扱い上の注意：「取扱い上の注意」の項参照

	0.25g	0.5g	1g
承認番号	22500AMX01982000	22500AMX01983000	22500AMX01984000
薬価収載	2014年6月	2014年6月	2014年6月
販売開始	2009年6月	2009年6月	1997年7月
再評価結果	2004年9月	2004年9月	2004年9月

※※ **【禁忌(次の患者には投与しないこと)】**
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

※※ **【原則禁忌(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)】**
セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

販売名	セフォチアム 塩酸塩静注用 0.25g「SN」	セフォチアム 塩酸塩静注用 0.5g「SN」	セフォチアム 塩酸塩静注用 1g「SN」
成分・分量 (1バイアル中)	セフォチアム 塩酸塩 …0.25g(力価)	セフォチアム 塩酸塩 ……0.5g(力価)	セフォチアム 塩酸塩 ……1g(力価)
添加物	無水炭酸ナトリウム ……60.5mg	無水炭酸ナトリウム ……121mg	無水炭酸ナトリウム ……242mg
性状	白色～淡黄色の粉末である。		
pH	5.7～7.2(0.5g(力価)/5mL日局注射用水)		
浸透圧比 (生理食塩液 に対する比)	約1(0.25g(力 価)/10mL日局 注射用水)	約1(0.5g(力 価)/20mL日局 注射用水)	約1.8(1g(力 価)/20mL日局 注射用水)

【効能・効果】**<適応菌種>**

セフォチアムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア・レットゲリ、インフルエンザ菌

<適応症>

敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、胆囊炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎

※ <効能・効果に関連する使用上の注意>

扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」¹⁾を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

【用法・用量】

通常、成人にはセフォチアム塩酸塩として1日0.5～2g(力価)を2～4回に分け、また、小児にはセフォチアム塩酸塩として1日40～80mg(力価)/kgを3～4回に分けて静脈内に注射する。

なお、年齢、症状に応じ適宜増減するが、成人の敗血症には1日4g(力価)まで、小児の敗血症、化膿性髄膜炎等の重症・難治性感染症には1日160mg(力価)/kgまで增量することができる。

静脈内注射に際しては、日局「注射用水」、日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液」に溶解して用いる。また、成人の場合は本剤の1回用量0.25～2g(力価)を糖液、電解質液又はアミノ酸製剤などの補液に加えて、30分～2時間で点滴静脈内注射を行うことができる。

なお、小児の場合は上記投与量を考慮し、補液に加えて、30分～1時間で点滴静脈内注射を行うことができる。

<注射液の調製法と調製時の注意>

○本剤は緩衝剤として無水炭酸ナトリウムを含有し、溶解時に炭酸ガスを発生するため減圧バイアルにしてある。溶解にあたっては静注用0.25g、0.5gには約3mL、静注用1gには約5mLの溶解液をバイアル内に注入して溶解すること。

なお、静脈内注射に際しては静注用0.25gは通常10mLに、静注用0.5g、1gは通常20mLに希釈して投与する。点滴静脈内注射を行う場合、注射用水を用いると溶液が等張とならないため用いないこと。溶解にあたっては、溶解方法説明書きをよく読むこと。

○本剤の注射液調製時にショックを伴う接触荨麻疹があらわれることがあるので調製時に手の腫脹・瘙痒・発赤、全身の発疹・瘙痒、腹痛、恶心、嘔吐等の症状があらわれた場合には以後本剤との接触を避けること。

<用法・用量に関する使用上の注意>

- (1)高度の腎障害のある患者には、投与量・投与間隔の適切な調節をするなど慎重に投与すること。
- (2)本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病的治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2)本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体质を有する患者
- (3)高度の腎障害のある患者[高い血中濃度が持続することがある。]
- (4)高齢者(「5.高齢者への投与」の項参照)
- (5)経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、全身状態の悪い患者[ビタミンK欠乏症状があらわれることがあるので観察を十分に行うこと。]

※2. 重要な基本的注意

本剤によるショック、アナフィラキシーの発生を確実に予知できる方法がないので、次の措置をとること。

- (1)事前に既往歴等について十分な問診を行うこと。なお、抗生物質等によるアレルギー歴は必ず確認すること。
- (2)投与に際しては、必ずショック等に対する救急処置のとれる準備をしておくこと。
- (3)投与開始から投与終了後まで、患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行うこと。特に、投与開始直後は注意深く観察すること。

3. 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
利尿剤 フロセミド等	他のセフェム系抗生素で併用による腎障害増強作用が報告されているので、併用する場合には腎機能に注意すること。	機序は不明であるが、利尿時の脱水による血中濃度の上昇等が考えられている。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)

※1)ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、不快感、口内異常感、眩暈、便意、耳鳴、発汗、喘鳴、呼吸困難、血管浮腫、全身の潮紅・蕁麻疹等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

※2)急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3)汎血球減少、無顆粒球症、顆粒球減少、溶血性貧血、血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

4)偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

5)発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球增多等を伴う間質性肺炎、PIE症候群等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

※6)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

7)痙攣等の中枢神経症状があらわれることがある。特に、腎不全患者にあらわれやすい。(「用法・用量に関する使用上の注意」の項参照)

8)AST(GOT)、ALT(GPT)の著しい上昇等を伴う肝炎、肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、紅斑、瘙痒、発熱、リンパ腺腫脹、関節痛
血液	貧血、好酸球增多
肝臓	AST(GOT)、ALT(GPT)、AL-P、LDH、γ-GTPの上昇
消化器	悪心、下痢、嘔吐、食欲不振、腹痛
菌交代症	口内炎、カンジダ症
ビタミン欠乏症	ビタミンK欠乏症状(低プロトロンビン血症、出血傾向等)、ビタミンB群欠乏症状(舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等)
その他	めまい、頭痛、倦怠感、しびれ感

注)このような場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。

5. 高齢者への投与

次の点に注意し、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

(1)高齢者では生理機能が低下していることが多く副作用が発現しやすい。

(2)高齢者ではビタミンK欠乏による出血傾向があらわれることがある。

6. 妊婦・産婦・授乳婦等への投与

妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない。

8. 臨床検査結果に及ぼす影響

(1)テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査では、偽陽性を呈するがあるので注意すること。

(2)直接クームス試験陽性を呈するがあるので注意すること。

9. 適用上の注意

(1)投与経路：本剤は静脈内注射にのみ使用すること。

(2)投与方法：静脈内大量投与により、まれに血管痛、血栓性靜脈炎を起こすことがあるので、これを予防するために注射液の調製、注射部位、注射方法等について十分注意し、その注射速度はできるだけ遅くすること。

(3)溶解後：溶解後は速やかに使用すること。

(4)小児に点滴静脈内注射を行う際には、十分な血中濃度を得るために、30分～1時間で投与を行うこと。

10.その他の注意

本剤の投与に際しては、定期的に肝機能、腎機能、血液等の検査を行うことが望ましい。

【薬効薬理】²⁾

セフォチアムは、グラム陽性菌及び陰性菌に対して広範な抗菌活性を示し、その抗菌力はグラム陽性菌ではセファゾリンとほぼ同等、グラム陰性菌に対してはセファゾリン及びセフメタゾールより明らかに強い。また、臨床分離のインフルエンザ菌においては、セファゾリンと比較して本剤に高い感受性が認められている。

セフォチアムは、細菌細胞壁の合成を阻害する。細胞外膜透過性に優れ、 β -ラクタマーゼに比較的安定で、かつ細胞壁ペプチドグリカン架橋形成阻害作用が強いため、グラム陰性菌に対し強い抗菌力を示すものと考えられている。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：セフォチアム塩酸塩
(Cefotiam Hydrochloride)


略号：CTM

化学名：(6R,7R)-7-[2-(2-Aminothiazol-4-yl)-acetylamino]-3-[1-(2-dimethylaminoethyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid dihydrochloride

分子式： $C_{18}H_{23}N_9O_4S_3 \cdot 2HCl$

分子量：598.55

構造式：




性状：白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である。

水、メタノール又はホルムアミドに溶けやすく、エタノール(95)に溶けにくく、アセトニトリルにほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

本剤を両頭針付き溶解剤(ハーフキット)に溶解して使用する場合



点滴開始時：薬剤溶解後に炭酸ガスが発生し、点滴筒内の液面が下がるので、あらかじめ点滴筒の2/3まで薬液を溜めた後、点滴を開始すること。[点滴開始時に液面が低い場合、チューブ内にエアーが入ることがある。]

安定性試験結果³⁾

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、6ヶ月)の結果、セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「SN」、セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「SN」及びセフォチアム塩酸塩静注用1g「SN」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包装】

セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「SN」

[1バイアル中0.25g(力価)] : 10バイアル

セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「SN」

[1バイアル中0.5g(力価)] : 10バイアル

セフォチアム塩酸塩静注用1g「SN」

[1バイアル中1g(力価)] : 10バイアル

【主要文献】

※1)厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き

2)第十七改正日本薬局方解説書 廣川書店

3)シオノケミカル株：セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「SN」、セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「SN」及びセフォチアム塩酸塩静注用1g「SN」の安定性に関する資料(社内資料)

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

シオノケミカル株式会社 学術情報本部

〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目10番10号

TEL: 03-5202-0213

FAX: 03-5202-0230