

血行促進・皮膚保湿剤

# ヘパリン類似物質クリーム 0.3%「SN」

Heparinoid

ヘパリン類似物質製剤

標準品：ヒルドイドクリーム0.3%

## 20gチューブ包装

包装規格：20g×10本

チューブ [サイズ：約35×105mm]



個装箱 [サイズ：35×281×113mm]



性状：


白色乳剤性軟膏剤で、わずかに特異なおいがある



## 500g瓶包装

瓶 [サイズ：胴径 89mm、高さ 135mm]

個装箱 [サイズ：91×91×136mm]



【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)のある患者〔血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれがある。〕
- (2) 僅少な出血でも重大な結果を来すことが予想される患者〔血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれがある。〕

和名 ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「SN」  
洋名 Heparinoid Cream 0.3% 「SN」  
一般名 ヘパリン類似物質 (Heparinoid)

貯法 室温保存  
使用期限 外装及び直接の容器に表示 (3年)  
規制区分 該当しない

承認番号 22600AMX00805000  
薬価収載 2014年12月  
販売開始 1996年7月

**【禁忌 (次の患者には使用しないこと)】**

- (1) 出血性血液疾患 (血友病、血小板減少症、紫斑病等) のある患者  
〔血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれがある。〕  
(2) 僅少な出血でも重大な結果を来すことが予想される患者〔血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれがある。〕

**【組成・性状】**

|               |  |
|---------------|--|
| 販売名           | ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「SN」   |
| 有効成分<br>(1g中) | ヘパリン類似物質…3mg   |
| 添加物           | 自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、大豆レシチン、セタノール、白色ワセリン、トリ (カプリル・カプリン酸) グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、ジメチルポリシロキサン、チモール、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、グリセリン |
| 性状            | 白色乳剤性軟膏剤で、わずかに特異なおいがある   |
| 識別コード         | HCR-SN   |

**【効能・効果】**

血栓性静脈炎 (痔核を含む)、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患 (注射後の硬結並びに疼痛)、凍瘡、肥厚性癬痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷 (打撲、捻挫、挫傷) 後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸 (乳児期)

**【用法・用量】**

通常、1日1~数回適量を患部に塗擦又はガーゼ等にのぼして貼付する。

**【使用上の注意】**

**1. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

**その他の副作用**

次のような症状があらわれた場合には、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

| 頻度不明      |                   |
|-----------|-------------------|
| 過敏症       | 皮膚炎、そう痒、発赤、発疹、潮紅等 |
| 皮膚 (投与部位) | 紫斑                |

**2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与**

妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。

**3. 適用上の注意**

投与部位：潰瘍、びらん面への直接塗擦を避けること。

眼には使用しないこと。

**【取扱い上の注意】**

**安定性試験結果**

最終包装製品を用いた長期保存試験 (温度 6.8~32.3℃、相対湿度 39~93%、3年間) の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「SN」 は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

詳細は添付文書をご参照ください。添付文書の改訂にご留意ください。

2014年12月改訂 (第6版) 添付文書に基づいて作成