

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2022年5月

製造販売元 江州製薬株式会社

勃起不全治療剤
タダラフィル錠

タダラフィル錠10mgCI「GO」 タダラフィル錠20mgCI「GO」

謹啓 時下益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、標記製品に関しまして「使用上の注意」を改訂致しますのでご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

1.改訂内容[改訂箇所: _____部]

改訂後	改訂前															
<p style="text-align: center;">【使用上の注意】</p> <p>3.相互作用 本剤は主に CYP3A4 により代謝される。 (1)併用禁忌(併用しないこと) 省略 (2)併用注意(併用に注意すること)</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>省略</td><td>省略</td><td>省略</td></tr><tr><td>ベルイシグアト</td><td>症候性低血圧を起こすおそれがある。治療上の有益性と危険性を十分に考慮し、治療上やむを得ないと判断された場合にのみ併用すること。</td><td>細胞内cGMP濃度が増加し、降圧作用を増強するおそれがある。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	省略	省略	省略	ベルイシグアト	症候性低血圧を起こすおそれがある。治療上の有益性と危険性を十分に考慮し、治療上やむを得ないと判断された場合にのみ併用すること。	細胞内cGMP濃度が増加し、降圧作用を増強するおそれがある。	<p style="text-align: center;">【使用上の注意】</p> <p>3.相互作用 本剤は主に CYP3A4 により代謝される。 (1)併用禁忌(併用しないこと) 省略 (2)併用注意(併用に注意すること)</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>省略</td><td>省略</td><td>省略</td></tr></tbody></table> <p>←追記</p>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	省略	省略	省略
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子														
省略	省略	省略														
ベルイシグアト	症候性低血圧を起こすおそれがある。治療上の有益性と危険性を十分に考慮し、治療上やむを得ないと判断された場合にのみ併用すること。	細胞内cGMP濃度が増加し、降圧作用を増強するおそれがある。														
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子														
省略	省略	省略														

2. 改訂理由：

自主改訂により「相互作用」の項を改訂致しました。

3. 本情報はDSU(医薬品安全対策情報)No. 308(2022年6月上旬発送予定)に掲載されます。

4. 添付文書情報は「医薬品医療機器総合機構ホームページ

(URL:<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)」においてもご確認いただけます。

以上